

# 府中市からののお知らせ



5歳から11歳のお子様と  
保護者の方へ



## 新型コロナワクチン追加接種 についてのお知らせ



接種費用  
無料  
(全額公費)

## 新型コロナワクチン接種

おうちの人と一緒にこの説明書を読んで、ワクチンを受けるか相談しましょう。

接種当日は母子健康手帳もご持参ください。

# 5歳から11歳のお子様の保護者の方へ

〈令和5年秋開始接種のお知らせ〉

## 小児接種の概要

- ◎接種の対象 初回（1・2回目）接種を終了した5歳から11歳のお子様を対象です。（※1）  
※乳幼児（生後6か月～4歳）接種での初回接種は、3回で1セットです。
- ◎使用するワクチン ファイザー社またはモデルナ社の小児用オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンを使用します。
- ◎接種間隔 前回の接種日から3か月以上、間隔をあけて接種します。
- ◎接種回数 1回
- ◎実施期間 令和5年9月20日から令和6年3月31日まで
- ◎接種費用 自己負担なし（無料）

（※1）使用するワクチンによって接種対象年齢が異なります。ファイザー社：5歳～11歳 モデルナ社：6歳～11歳

## 新型コロナワクチンの効果

### Q.新型コロナワクチンは、どのような効果がありますか？

A.新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症状が出にくくなります。

ファイザー社のワクチンは、5～11歳の小児においても、現在の流行株であるオミクロンXBB系統に対して、中和抗体価の上昇が確認され、重症化予防はもとより発症予防効果も期待されています。モデルナ社のワクチンも6～11歳の小児において、同様の効果が期待されています。

## 新型コロナワクチンの安全性

### Q.子どもが新型コロナワクチンを受けた後は、どのような症状が出ますか？

A.注射した部分の痛みが一番多く現れます。

安全性は既承認の製剤と同様であり、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等、様々な症状が確認されていますが、ほとんどが軽度または中等度であり回復していることなど、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。

#### ■数日以内に起こることがある症状

症状が出た人の割合	症 状	
	ファイザー社のワクチン(5～11歳)	モデルナ社のワクチン(6か月以上)
50%以上	疼痛(※1)、疲労	疼痛(※1)、頭痛、疲労、易刺激性・泣き(※3、注)
5～50%	発赤・紅斑、腫脹(※2)、頭痛、下痢、筋肉痛、関節痛、悪寒、発熱	傾眠(※4、注)、食欲減退(注)、腫脹・硬結(※5)、発赤・紅斑、悪心・嘔吐、筋肉痛、関節痛、リンパ節症(※6)、悪寒、発熱
1～5%	嘔吐	遅発性反応(疼痛・腫脹・紅斑等)(※7)

(※1) 注射部位の痛み (※2) 注射部位の腫れ (※3) 機嫌が悪い (※4) 眠たくなる様子 (※5) 腫脹・硬結：注射部位の腫れ、固くなること (※6) リンパ節症：注射部位と同じ側の腋の腫れや痛み (※7) 遅発性反応：接種後7日目以降の痛みや腫れなど (注)：生後6か月～5歳のみ

### Q.若い男子ほど接種後に心筋炎を発症しやすいと聞きますが、子どもはどうでしょうか？

A.米国では、12～17歳男子に比べ5～11歳男子の方が、心筋炎が報告される割合が低いとされています。

ごくまれですが、海外では子どもでも軽症の心筋炎を発症した例が報告されています。

米国では、新型コロナワクチン接種後の心筋炎の報告率は、5～11歳の男子の方が12～15歳や16～17歳の男子より低いとされています。

ワクチン接種後4日程度の間にお子様に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。

なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

令和5年秋冬の接種では、接種目的が重症化予防とされたことから、重症化リスクの高い方にのみ努力義務の規定が適用されています。ただし、接種は強制ではなく、ご本人や保護者の方の判断に基づいて受けていただくことに変更はありません。

詳しくは厚生労働省ホームページQ&Aをご覧ください。→





## 新型コロナワクチンを受けるには

### ◎ワクチンの接種を受けるには**予約が必要です**。

接種を希望する場合は、予約サイトまたはコールセンターへの電話で予約をしてください。  
前回の接種日から3か月経過後に接種ができます。接種日程や予約開始日などの最新の情報は、市のホームページや公式LINEなどで随時お知らせします。



府中市HP



府中市LINE

### ◎**接種会場**(令和5年12月以降、接種会場が変更となります。)

**府中市保健福祉総合センターリ・フレ(広谷町)**で集団接種を行います。

### ◎近隣の接種会場でも接種できます。

県内であれば近隣の接種会場でも接種を受けることができます。  
近隣の接種会場は、右のQRコードから確認できます。



近隣の接種会場  
(びんごライフ特設サイト)

### ◎ワクチン接種の際には、次の点にご注意ください。

- 他のワクチンを受ける場合(インフルエンザの予防接種は除く)は、**13日以上の間隔**を空けてください。
- 37.5℃以上の熱**がある場合や、**体調不良**の場合には接種を受けることができません。
- ワクチンは上腕部に注射するため、**肩を出しやすい服装**でお越しください。

### ◎お子様のワクチン接種には、**保護者の方の同意と立ち合いが必要です**。

ワクチンを受ける際は、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいたうえで保護者の方の意思に基づいて接種を判断してください。保護者の同意なく、接種が行われることはありません。周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

### ◎ワクチン接種当日は**母子健康手帳**を持参してください。

子どものワクチン接種履歴は、母子健康手帳で管理しているため、接種当日には母子健康手帳を持参してください。  
封筒の中身一式、本人確認書類を忘れずにお持ちください。

- ◆持参するもの ○接種券一体型予診票(事前に記入してください) ○接種済証 ○母子健康手帳
- 本人確認書類(健康保険証など) ○お薬手帳(お持ちの場合)



### ◎ワクチンについての**疑問や不安があるときはかかりつけ医などにご相談ください**。

新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医などにご相談ください。また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医などにご相談ください。

## ご相談先など

### ◎新型コロナワクチンに関するご相談先

ワクチン接種後に、体に異常があるとき ワクチンに関する専門的な相談	→ ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、 広島県新型コロナウイルスワクチン相談センター ☎082-513-2847
ワクチン接種全般に関するお問い合わせ	→ 府中市ワクチン接種コールセンター ☎0847-54-2571 受付9:00~17:00



### ◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます(※)。申請に必要な手続きなどについては、府中市健康推進課にご相談ください。

(※) その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、しっかり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。

(※) マスクの着用は個人の判断が基本となります。



密集した場所



密集した場面



密閉された空間



マスクの着用(※)



石けんで手洗い



手指の消毒



こまめな換気

子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 子ども

検索



# 5歳から11歳のお子様へ

## オミクロン株対応ワクチン接種についてのお知らせ

### 新型コロナワクチンをなぜ受けるの？

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、  
ねつ、だるさ、せき、息ぐるしさ、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、  
体の調子が悪くなります。

ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる  
ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。



### 新型コロナワクチンを受けるときは、どんなことに注意すればいいの？

<p><b>受ける前</b></p>	<p>37.5℃以上のねつがあるときや、体の調子が悪いときは、 ワクチンを受けられないので、そのことをおうちの人に伝えましょう。</p>	
<p><b>受ける時</b></p>	<p>ワクチンは肩の近くに注射します。肩を出しやすい服で、受けに行きましょう。</p>	
<p><b>受けた後</b></p>	<p>◎ワクチンを受けた後、15分以上はすわって様子をみましょう。(30分様子をみる場合もあります)</p> <p>◎ワクチンを受けると、右のような症状が出るがありますが、2～3日で自然とよくなるのがわかっています。</p>	<p>◎当日はお風呂に入るなど、いつも通りの生活をするのは問題ありませんが、激しい運動はやめましょう。</p> <p><input type="checkbox"/> ねつ      <input type="checkbox"/> さむけ  <input type="checkbox"/> だるさ      <input type="checkbox"/> 気持ちわるさ  <input type="checkbox"/> 頭のいたみ      <input type="checkbox"/> おなかをこわす</p>

### こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

● 受けたすぐ後

- 体のかゆさ
- せき



● 受けた日や4日くらいの間

- ねつ       頭のいたみ       胸のいたみ       息ぐるしさ
- だるさ       さむけ       胸がドキドキした感じ



### 前回のワクチンを受けた後、

3か月以上の間をあけて、追加接種（3回目以降）を受けてください。



### 守ってほしい、大切なこと。

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にしてはいけません。

